

بچے کی پیدائش کے لیے کئے جانے والے آپریشن کے زخم

کی حفاظت کرنا

میٹرنیٹی سر و س کی طرف سے مریضوں کے لیے ہدایات

Caring for your caesarean section wound (Urdu)

تاریخ اشاعت  
اپریل 2011  
دوبارہ جائزہ لینے کی تاریخ  
اپریل 2013  
شمارہ نمبر  
01  
ڈیپارٹمنٹ  
دومنز سر و سز



Caring for your caesarean section  
wound (Urdu)

Issue date: April 2011

Review date: April 2013

Version No: 01

Translated by Global Language  
Services Ltd April 2011

## تعارف

اگرچہ بچے کی پیدائش کے لیے کئے جانے والے آپریشن کا تندرست ہو جانے والا زخم چھوٹا سا لگتا ہے، لیکن یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ آپریشن کرنے کے اس عمل میں صرف آپ کی جلد کو ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے چربی اور پٹھوں کی تہوں اور پچہ دانی کی دیواروں بھی چیرا (کاٹا) جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ اوپر والی تہوں کو ملایا اور جوڑا (بند کیا) جائے تاکہ نیچے ہونے والی سرجری (آپریشن) کے زخم کو بند کیا جاسکے، ہر تہہ کو الٹی ترتیب (یعنی پہلے سب سے نیچے والی تہہ کو، پھر اس سے اوپر والی تہہ کو...) سے ٹانگے لگائے جاتے ہیں۔

اگرچہ باہر سے نظر آنے والے زخم 24 سے 48 گھنٹوں میں بند کر دیا جائے گا، لیکن اس کے نیچے والے پٹھے (ٹشوز) کئی مہینوں تک تندرست ہوتے رہتے ہیں یعنی انہیں تندرست ہونے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔

## زخم کی فوری حفاظت

آپریشن تھینئر سے واپس آنے پر آپ کے زخم کے نشان کو پٹی سے ڈھانپ دیا جائے گا۔ اسے جہاں تک ممکن ہو کم از کم 48 گھنٹوں تک چھپنا نہیں چاہیے تاکہ زخم تندرست ہونے کا عمل شروع ہو سکے۔

اس دوران زخم خراب ہونے یا پٹی ہلنے (اترنے) کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ہکا ہاتھ یا شاور کرنا بہتر ہو گا۔ اس کے بعد، پٹی اتاری جاسکتی ہے اور آپ اچھی (پوری) طرح نہا سکتے ہیں۔ اگر کسی بھی وجہ سے 48 گھنٹوں کے اندر پٹی اتاری جاتی ہے تو براہ مہربانی عملے کے ممبر کو بتادیں۔

آپ کے زخم کو سونیوں یا دھاگے کے ٹانکوں سے بند کیا گیا ہو گا۔ عملہ آپ کو بتا دے گا کہ ان سونیوں یا دھاگے کے ٹانکوں کو کب نکالنے کی ضرورت ہوگی، عام طور پر یہ ٹانگے آپریشن ہونے کے 4 سے 5 دنوں کے بعد نکال دیئے جاتے ہیں۔

## زخم کی ہمیشہ حفاظت کرتے رہنا

آپ انفیکشن ہونے کے خطرے کو کم کرنے اور زخم تندرست ہونے کے عمل میں مندرجہ ذیل باتوں سے مدد کر سکتے ہیں:

- ☆ اپنے زخم کو ہمیشہ صاف ستھرا اور خشک رکھیں۔
- ☆ ہاتھ استعمال کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح صاف کر لیں
- ☆ ہاتھ کر لینے (نہا لینے) کے بعد اپنے زخم کو ایسے صاف تولیے سے احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ خشک کریں جو صرف اس کے استعمال کے لیے ہی رکھا گیا ہو۔
- ☆ اپنے کپڑوں کا انتخاب احتیاط سے کریں۔ اس بات کا یقین کر لیں یہ کپڑے آرام دہ ہوں اور زخم کے خلاف رگڑ نہ کھاتے ہوں۔
- ☆ کھانسنے وقت اپنے دونوں ہاتھ سپورٹ کے لیے زخم کے دونوں طرف رکھ لیں۔

☆ درد میں ہونے والے اضافے کے بارے میں، زخم پر سرخی آجانے یا اگر اس میں سے کچھ نکلنے لگے تو فوری طور پر اپنی ڈوائف (دائی) یا اپنے جی پی کو بتائیں۔

## اضافی معلومات

### حساسیت (زخم)

ہو سکتا ہے کہ تھوڑے عرصے کے لیے آپ کا زخم اور اس کے ارد گرد کی جگہ حساس لگے یعنی معمولی سا ہاتھ لگانے سے تکلیف دیتی ہو۔ یہ ایک عام سی بات ہے اور زیادہ تر یہ جگہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔

### درد سے نمٹنا

براہ مہربانی اپنی درد مارنے والی ادویات ہدایات کے مطابق کھائیں۔ اگر آپ کے درد میں آفاقہ نہیں ہو تا تو براہ مہربانی اپنی ڈوائف (دائی) یا اپنے جی پی سے بات کریں۔

## حرکت کرنا اور کوئی چیز اٹھانا

آپ کو کم از کم چھ (6) ہفتوں کے لیے کوئی بھاری چیز نہیں اٹھانی چاہیے (پانی سے بھری ہوئی کیتلی سے زیادہ کوئی وزن)۔ ایسا کرنا آپ کے زخم کے نیچے گہرائی میں پائے جانے والے پٹھوں (ریشوں) کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ براہ مہربانی بچے کی پیدائش کے لیے کئے جانے والے آپریشن کے بعد، ورزش، آرام کرنے، حرکت کرنے اور وزن اٹھانے کے بارے میں زیادہ تفصیلی مشورے کے لیے فزیو تھیراپی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے فراہم کردہ لیفلٹ ”پوسٹ نیٹل ایڈوائس“ ملاحظہ کریں۔

## غذائیت

ناموزوں غذا اور خون میں فولاد کی کمی، بچے کی پیدائش کے لیے کئے جانے والے آپریشن کے بعد پیٹ پر ہونے والے زخم کے دیر سے تندرست ہونے کی وجہ مانے جاتے ہیں۔ اسی لیے زخم کے تندرست ہونے کے عمل میں مدد کے لیے صحت مند اور متوازن خوراک کھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید مشورہ لینا چاہتے ہوں تو اپنی ڈوائف (دائی)، اپنے جی پی، ڈائٹیشن (غذائیت کے ماہر) یا پبلک ہیلتھ نرس سے بات کریں۔

## موٹاپا

بچے کی پیدائش کے لیے کئے جانے والے آپریشن کے بعد موٹاپے کا زخم میں انفیکشن ہونے سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے آپ کے زخم پر تیلیکی طور پر بہت زیادہ دباؤ ہو گا جو زخم کے تندرست ہونے کے عمل میں تاخیر کر سکتا ہے۔ لہذا، اس لیے یہ اور بھی ضروری ہے کہ ایسے حالات میں اپنے زخم کی حفاظت کے لیے اور بھی توجہ دی جائے۔